

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-2-2-76144620

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes  
de la Protection des Végétaux  
93, RUE DE CURAMBOURG  
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS  
C. C. P. : La Source 4604-25

BULLETIN TECHNIQUE N° 81

30 JANVIER 1976

### REABONNEMENT AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Nous demandons à nos abonnés qui n'ont pas encore renouvelé leur abonnement pour 1976 de bien vouloir le faire le plus rapidement possible.

Nous rappelons que le prix de l'abonnement ordinaire est fixé à 50 F pour 1976. Pour plus de détails, se reporter au numéro 79.

#### GROSSE ALTISE

#### COLZA

Les sondages effectués au mois de Janvier montrent une certaine augmentation du nombre de larves mais dans l'ensemble ces larves sont encore jeunes. Dans certaines situations, ces larves jeunes sont nombreuses.

Le froid actuel est défavorable au développement larvaire de la grosse altise mais cette situation peut évoluer assez rapidement si le temps redevient doux. Il conviendra donc si le temps se radoucit de poursuivre les sondages en Février pour voir si le seuil d'intervention de deux larves âgées en moyenne par pied est atteint afin de traiter le cas échéant.

Si une intervention s'avère nécessaire, utiliser de préférence un Oléoparathion à la dose de 350 grammes de Parathion par hectare.

#### CLOQUE DU PECHER

#### ARBRES FRUITIERS

La protection du pêcher contre la cloque n'est nécessaire que pendant une courte période. Le stade végétatif à partir duquel les contaminations sont possibles se situe dès que le bourgeon à bois s'allonge légèrement, s'entrouvre, laissant apparaître, si on le regarde par dessus, le point vert ou rougeâtre de la première feuille (stade B).

Les conditions climatiques actuelles sont défavorables à la reprise de la végétation des pêchers mais dès le premier réchauffement, le stade sensible risque d'être rapidement atteint.

Il conviendra donc de surveiller les pêchers afin d'appliquer le traitement au moment le plus favorable. Ce premier traitement est toujours le plus efficace. On peut choisir l'un des produits suivants :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - Produits cupriques : 500 g de cuivre métal/hl | - Ferbame : 175 g MA/hl |
| - Captafol : 120 g MA/hl                        | - Thirame : 175 g MA/hl |
| - Captane : 250 g MA/hl                         | - Zirame : 175 g MA/hl  |

Pour ce traitement précoce il est préférable d'utiliser un produit cuprique.

Un seul traitement suffit s'il est appliqué dès que le pêcher arrive au stade sensible, lorsque le départ de la végétation est rapide et les pluies peu abondantes. Si le printemps est frais et les pluies abondantes, une autre application doit être envisagée mais son intérêt diminue au fur et à mesure que la végétation se développe. La période de sensibilité se termine pratiquement avec l'étalement des premières feuilles.

Pour les variétés plus tardives, il convient d'intervenir dès que la plupart des bourgeons à bois seront arrivés au stade sensible défini précédemment.

Les Ingénieurs chargés des  
Avertissements Agricoles

G. RIBAUT  
B. LELIEVRE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie  
Chef de la Circonscription phytosanitaire "CENTRE"  
G. BENAS

P3